© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dung so undeutlich, dass man mit freiem Auge nur hier und da einzelnstehende Strichelchen wahrnimmt.

Es ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, zu erörtern, inwieweit die ausser der reinen Grössendifferenz wahrnehmbaren Unterschiede in Skulptur und Zeichnung eine Varietäts-Berechtigung begründen mögen, aber leicht begreiflich bleibt es immerhin, das das auf den ersten Blick befremdende Gepräge dieser Clausilie auch zu Combinationen und neuen Aufstellungen verlocken konnte. Beweis dafür, dass die seither als species delenda bereits wieder in Abgang gebrachte Idyla Gobanzi Parr. seinerzeit auf diese grosse Form gegründet wurde.

Am 23. Mai 1876 fand ich am bezeichneten Fundorte ein gegen 17 mm. langes doppelmündiges Exemplar mit wohlerhaltener erster Mündung, und mit vollständig ausgebauter nur etwas dünnschaligerer Ersatzmündung.

(Schluss folgt.)

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Purpura		luteostoma, Chm. Philipp.	0,50-80
bicostalis, Lm. Panama	0,50-1	melones, Ducl.&v. crassa Pacif	0,30-50
biserialis, Blvlle. Mazatlan	0,40 50	patula, L. In. occ.	0,40-70
bituberculatis, Lm. Oc. ind.	0,50-80	pica, Blnv. Philippinen	1-1,20
bufo, Lm. „	0,80-1,20	rustica, Lm. St. Thomas	0,30-50
†*consul, Lm. Ind. orient.	0,80-1,20	squamosa, Lm. Prom b. sp.	0,20-40
dubia, Krauss Prom b. sp.	0,45	thiarella, Lm.v. min. Vanikoro	0,60
echinulata, Lm. Philipp.	1,20	trapa, Bolten St. Thomas	0,40-80
grisea, Dkr. Ind. orient.	0,30-50	tuberculatis, Lm. Tahiti	0,50
haemastoma, L. Oc. atl.	0,40-80	undata, Lm. Antillae	0,30-50
†haustrum, Martyn Nov. zeal.	0,80-1	Jopas francolin., Lm. Oc. ind.	0,50-1,20
hippocastaneum, L. Oc. ind.	0,30-60	„ sertum, Brug. M. rub.	0,30-50
lapillus, L. Europa	0,20-40	*Ricinula*	
„ v. imbricata, Lm. Isl. etc.	0,80-1,50	albolabris, Blnv. Ceylon	0,30-50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
digitata, Lm. Oc. ind.	0,40-80	mediterraneum, Dsh. M. med.	0,20-40
horrida, „ „	0,20-50	moluccanum, Gmel. Philipp.	0,30-40
lobata, Blnv. „	0,40-60	moniliferum, Drp. Suez etc.	0,20-30
Sistrum		nodulosum, Brug. S. Pacific	1
anaxares, Ducl. M. rubr.	0,30	obeliscus Brug. & vars. M. rub.	0,20-60
fiscellum, Chm. Austral.	0,40-60	palustre, L. Ind. or.	0,40-80
morus, Lm. Pacific	0,40-50	perversum, L (Triforis) M. med	0,15-25
muticum, Lm. Mozambique	0,50	procerum, Klein & vars. Oc. ind.	0,50-60
spectrum, Rve. M. austr.	0,40-50	pulchellum, Brug. Dalmat.	0,20
tuberculatum, Blnv. „	0,40-60	reticulatnm, Da Costa M. med.	0,5-10
Monoceros		Rhizophorae, Krss. S. Africa	0,30-40
cingulatum, Kien. Mexi.	1,50	Rüppellii, Phil. M. rub.	0,25
lugubre, Sow. v. maxim. Calif.	2	septemstriatum, Say, Antillae	0,10
Rapana coronata, Lm. Maurit.	0,40-60	striatissimum, Sow. „	0,20-30
Cerithium		tuberculatum, Lm. M. rub.	0,30-40
alternatum, Phl. Andaman In.	0,30-40	variegatum, Quoy M. rub.	0,10-20
aluco, L. Philipp.	0,40-50	vertagus, L. Molucken	0,20-30
asper, L. M. austr.	0,20-40	vulgatum, Brug. M. med.	0,20-40
„ v. lineatum, Gm. Oc. ind.	0,30-40	*Cerithidea*	
atratum, Gml. Antillae	0,20-30	ambigua, Adams, Jam.	0,10-20
Caillaudi, Pot. M. rub.	0,20-30	iostoma, Pfr. Cuba	0,30-40
caudatum, Sow. Guadeloupe	0,20-30	decollata, L. Madagscr. etc.	0,30-40
columna Sow. M. rubr.	0,40-50	obtusa, Lm. Philipp.	0,20-40
echinatum, Lm. Mauritius	0,30-50	varicosa, Sow. Panama	0,30-40
eriense, Val. Antillae	0,10	*Unio*	
erythräense, Lm. M. rubr.	0,40-50	aegyptiacus. Caill & var. Nil	0,40-50
fasciatum Brug. Ceylon	0,30-50	†alatus, Say Amer. bor.	0,80-1
ferrugineum, Say Mexico	0,30	ater, Nilss. Nahe etc. & vars.	0,20-35
fluviatile, Pot. Oc. ind.	0,20-40	batavus, Lm. Germania	0,20-30
fuscatum, Costa M. med.	0,20-30	„ v. amnicus, Zglr. Carniola	0,30
gallopagiuis, Bens.? Ceylon.	0,30	„ v. carinthiacus, Zglr. Carinthia	0,40
gibberulum, Adams Ind. occ.	0,5-10	„ v. fusculus, Zglr. „	0,30
granosum, Kien. Madras etc.	0,30	„ v. pruinosus, Schm. Carniola	0,30
†granulatum, Brug. Senegal	0,30	„ v. reniformis, Schm. Carinthia	0,35
Kochii, Phil. M. rub.	0,20-30	Baudinii, Küst. Dalmatia	0,40
lima, L. M. med.	0,10	Birmanus, Blf. Birmah	1,20
lineatum, L. Pacific	0,40-50	Caffer, Krauss Prom. b sp.	1
litteratum, Brug. Ind. occ.	0,20		
maculosum, Kien. Mazatlan	0,50-70		
mamillatum, Risso Philipp.	0,20		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
cariosus, Say lac. Huron	0,80-1,80	siliquoideus, Barnes Mississ.	1,50
complanatus, Sol., Missisippi	0,50-80	spatulus, Lea Michigan	0,70
congeber, Meusc.? Java	0,30-50	Spinelli, Villa L. d'Idro Ital.	0,40-60
corrosus, Villa. L. de Iseo Ital.	0,30	succineus, Lanza Dalmat.	0,40
crassus, Retz Rhein & Mosel	0,30-50	tumidus, Retz & vars. Europ.	0,20
cucumoides, Lea Sumatra	1—2	valentinus, Rssm. Valencia	0,40-50
†delphinus, Gruner, Singap.	1-1,50	Verreauxianus, Lea	
ellipticus, Wag. Spix. Brasil.		prom. b. sp.	1
& Chili	0,50	*Margaritana*	
„ v. psammaticus, Bron.		arcuata, Gray? N. S. Wales	0,50-1
Brasill.	0,50	margaritifera, L. Nahe	0,40-60
fasciatus, Raf. Ohio	0,50-1,20	Australiae? Australiae	0,50
Hopetonensis, Lea Georgia	1,30	*Monocondylaea*	
Kleinianus, Lea „	1	crebristriata, Anth. Amer. bor.	1
ligamentinus, L. & var. Ohio	1,60	scindiensis, ? Scinde	1,20
litoralis, L. Murcia & Valencia	0,50-80	Barbala plicata, Leach.	
„ v. rhomboides, Schr.		lacus St. Clair.	1,80
Algeria	0,40-60	„ rugosa, Barnes Vermont	1,80
„ v. subtetragona, Mich.		*Anodonta*	
Gallia	0,70	anatina, L. Europ. med.	0,20-30
lugubris, Lm. Georgia	0,40-70	„ v. coarctata, Pot. &	
marginalis, Lm. Ganges	1	Mich. Gall.	0,40
Molteni, Adami Umbria	0,50	„ v. idrina, Spinelli Ital.	0,50
Moreleti, Desh. Algeria	0,50	„ v. rostrata, Brot. Carinth.	0,35
Murrayensis? fl. Murray		„ v. Sebinensis, Adami	
Austral.	0,70-1,20	l. d'Iseo	0,50
navensis, Tischbein Nahe	0,30-40	„ vrs. alta, elongata, ro-	
obliquus, Lam. Mississippi	1,80	tunda Germ.	0,25-35
paranensis, Lea Port Alegre	1,20	catharacta, Say l. St. Clair	1,20
pictorum, L. Germania etc.	0,10-20	cellensis, Gml. Germ.	0,25-50
„ v. limosus, Nilss. Rhein	0,20	complanata, Zgl. Elbe & Suecia	0,25-40
„ v. ponderosus, Sol. Germ.	0,20-25	cygnea, L. Germ.	0,20-40
†„ v. platyrhynchus Ross.		equatoris? Ecuador	1,50
Carinth.	0,50	fragilis, Raf. C. St. Clair.	
radiatus, Gmel. L. Mississippi	0,70-1	Am. bor.	0,70-1,50
rhnaconicus, Pfr.		intermedia, Pfr. Bavaria	0,30-50
St. Leopoldo Br.	0,30-80	latomarginata, Lea. var.	
Sandrii, Villa v. sericatus		Uruguay	2,50
Rssm. Dalm.	0,50	„ v. minor. St. Leopoldo,	
Sheppardianus, Lea. Georgia	1,50	Brasil.	0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
limpida, Parr. Dalmatia	0,30-40	astur, Souv. N. Caledon.	0,50
montevideensis? Montevideo	1	calliope, Crosse „	0,30
piscinalis, Nilss. Glon fl. Bavaria	0,25-40	costulifera, Pfr. „	0,40
„ v. ponderosa, C. Pfr. Lahn etc.	0,25-40	multisulcata, Gass. „	0,40
„ ventricosa, Pfr. Bavaria	0,25-40	Macgregori, Cox Na. Hibern.	3,50
Rossmaessleri? Lm. Gallia	0,50	majuscula, Pfr. Na. Hibernia	3—4
triangularis, Lanza Dalmat.	0,50	Cochlost. lais, Pfr. 3 vars. Na. Hibernia à	0,80
uruguensis, Fér. Uruguay	1	„ Tukanensis, Pfr. vars. Na. Hibernia â	0,70
Leila uruguensis, Fér. „	0,30-60	Helix Lambei, Pfr. u. v. picta Na. Hibernia	1,20
Hyria corrugata. Amazon superior	7,50	Bul. mexicanus, Pfr. Mexico	0,50-1,40
Sphaerium mamillanum, Wld. Suecia	0,20	„ siamensis, Pfr. Siam	0,50-60
„ Westerlundi, Cless. „	0,20	Pseudachatina Wrighti, Sow. Calabar.	6
Bithynia tentacul. v. bottnica Andersson.	0,20	†Cypraea Scottii. Brod. Aust.	7,50
Planorbis		*Buccin. Tottenii, Stmp. syrtis Na. Ter.	3—4
spirorbis Müll. v. major Suecia	0,20	Glandina mitraeformis, Pfr. Mexico	4
dispar, Wstrld. „	0,20	Melanops. maroccanus, Chm. Algier	0,35
albus Müll. v. lemniscatus, Hartm. Suecia	0,20	Planorb. Dufourei, Graels „	0,30
glaber, Jeffr. „	0,20	Cyclostom. mamillaris, Lm. „	0,35
Amphipeplea glutinosa, Müll. Suecia	0,30	Argobuccinum vexillum, Sow Peru	3
Limnea stagnalis v. bottnica Cless. Suecia	0,25	*Eburna lutosa, Lm. Pacific	2
Succin. putris, v. suecica Cless. Suecia	0,20	Cassis coarctata, Wood. Kien. Pacific	1,50
Balea pyrenaica, Brug. „	0,20	*Triton parthenopeus v. Salis Napoli	6,50
Hyalina nitida, v. borealis Cless. Suecia	0,30	†Pyrula patula, L. Lm. Pacific	1
„ petronella, Charp. „	0,20	* „ melongena. Lm. Atlantic	2
Helix		†Voluta brasiliana, Sol. Lm. Brasil.	1,50
frutic. v. Andersoni, Cless. „	0,20		
lifouana, Crosse N. Caled. & v.	3		
Heckeliana, v. „ „ „	2,80		